



ENDO - Informed Consent (toestemmingsverklaring) ERCP

Patiëntenlever

ERCP: Een ERCP (Endoscopische Retrograde Cholangio-pancreaticografie) is een endoscopisch onderzoek waarbij de galwegen en het pancreaskanaal onderzocht kunnen worden. Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn, dit betekent dat u niet mag eten vanaf zes uur vóór het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een endoscoop waarbij een instrument met een camera aan het eind via uw mond in de twaalfvingerige darm wordt gebracht. Daarna worden na het inspuiten van contraststof foto's genomen met behulp van radiologie. Tijdens het onderzoek kan de geneesheer steentjes verwijderen nadat een snede is gemaakt in het spiertje van de uitmonding van het galkanaal ("papil van Vater"). Vernauwingen kunnen worden opgelost door het plaatsen van een stent. Dit is een klein hol buisje dat doorheen de vernauwing wordt opgeschoven in het galkanaal waardoor de afvloeit van galvocht terug kan worden hersteld. Andere diagnostische en therapeutische handelingen kunnen worden uitgevoerd indien dit nodig blijkt te zijn. De dag van het onderzoek mag u na het onderzoek alleen water drinken, verder mag u niets eten. Indien u de volgende dag geen pijn hebt en indien de arts bevestigd heeft dat de controle bloedname in orde is, kan u weer eten.

ANAESTHESIE: Via een infuus krijgt u vocht en medicatie toegediend. De medicatie is bedoeld om een algemene narcose te bekomen, zodat u het onderzoek goed verdraagt. Tijdens de narcose zal een intubatie en kunstmatige beademing worden uitgevoerd om de luchtwegen te beschermen en om het onderzoek voor u comfortabel te laten verlopen. Het medicijn dat hiervoor gebruikt wordt is propolipid, een kortwerkend middel dat intraveneus wordt opgetitreerd onder continue bewaking. Aangezien het medicament snel uitgewerkt is, bent u kort na de procedure al terug goed wakker. De enige contra-indicatie voor propolipid is een ei- of soja-allergie, dit moet u vooraf melden. Een zeldzame complicatie die kan optreden is aspiratie van maagsappen. Daarom is de anesthesist ook steeds aanwezig om dit snel op te vangen als dit zich zou voordoen.

VERWIKKELINGEN: Hoewel ERCP een redelijk veilig onderzoek is, dient u toch te weten dat er bepaalde risico's aan verbonden zijn. Uiteraard is het nut van het onderzoek groter dan de mogelijke complicaties. De pancreas kan ontsteken (*pancreatitis*), wat gebeurt bij ongeveer 5 % van de patiënten. Deze ontsteking uit zich door pijn in de bovenbuik. U moet dan nuchter blijven. Wanneer het noodzakelijk is het spiertje ("papil van Vater") door te snijden, is er een klein risico op *bloeding*, die gewoonlijk endoscopisch kan worden behandeld. Het insnijden van het spiertje kan ook een *perforatie* veroorzaken die meestal wordt verholpen met antibiotica. Ook deze verwikkeling is zeer zeldzaam. Deze verwikkelingen (en alle andere zeldzame complicaties) noodzaken mogelijk een verlengd ziekenhuisverblijf voor eventuele intraveneuze behandeling met antibiotica en uitzonderlijk een heilkundige behandeling.



BELANGRIJK

- **Ziekten en allergie:** Indien u diabetes-, hart-, of longpatiënt bent, dient u dit zeker aan de arts te melden. Vermeld ook eventuele allergieën voor geneesmiddelen (bijv. antibiotica) of latex. Vermeld ook allergie aan ei of soja gezien de narcose gebeurt met Propolipid.
- **Bloedverduunners** dienen vooraf aan een ERCP te worden gestopt. Hoelang op voorhand u moet stoppen dient u te bespreken met uw arts. Zo nodig wordt deze periode overbrugd met bloedverdunnende spuitjes (LMW-heparine). Het gebruik van bloedverduunners of eventuele stollingsstoornissen dient vooraf altijd te worden gemeld.
- Bij elk onderzoek wordt een gesteriliseerd toestel gebruikt en kan “single use”-materiaal (voor éénmalige toepassing) gebruikt worden, zoals een papillotoom, een extractieballon, een galwegenstent, een werkkanaalklepje, een reinigingsborstel, ea. Geheel conform de Belgische wetgeving wordt dit aangerekend. De kostprijs van het onderzoek hangt af van het al dan niet uitvoeren van bijkomende, noodzakelijke procedures. Bij elke ambulante verstrekking wordt eveneens klein verbruiksmateriaal aangerekend. In functie van uw **kamerkeuze** zullen kamersupplementen (kamer alleen) en ereloonsupplementen (130%) worden aangerekend. De artsen zijn geconventioneerd en gebruiken de door het RIZIV erkende tarieven. Een prijsindicatie kan opgevraagd worden via de dienst Facturatie indien gewenst (03/880.91.53).
- **Problemen:** Indien er thuis, na het onderzoek, ernstig bloedverlies zou zijn, hevige buikpijn of koorts zouden ontstaan, dient u de huisarts of behandelende arts te contacteren (03/880.91.84) of (buiten de werkuren) zich op de spoedgevallendienst aan te melden (03/880.95.20).

Heeft u nog vragen, dan kan u hiervoor terecht bij de gastro-enteroloog op het tel.nr. 03/880.91.84 of ook op de website www.hfr.be of www.maagendarmrumst.be.

Door dit dokument te ondertekenen verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze informatieverstrekking. Indien u deze toestemmingsverklaring weigert, dient u dit uitdrukkelijk te melden en kan het onderzoek niet doorgaan. Bij onmogelijkheid tot lezen of ondertekenen van dit dokument door patiënt zelf, wordt gevraagd om dit door een verwante persoon of verwijzende huisarts te laten ondertekenen.

Naam (voluit geschreven):

Datum: /...../.....

Handtekening: