



ENDO - Informed consent (toestemmingsverklaring) GASTROSCOPIE AMBULANT

Patiëntenklever

GASTROSCOPIE: Een gastroscopie is een onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm met behulp van een soepele buis met camera, welke via de mond wordt ingebracht. Tijdens het onderzoek kunnen staaltjes (biopsies) genomen worden voor microscopisch onderzoek. Op die manier kan meer informatie verkregen worden over de letsels die gezien worden of om ontstekingen en infecties op te sporen. Er zijn ook behandelingen mogelijk: een bloeding kan worden gestopt, een vernauwing kan worden verbreed, poliepen kunnen worden verwijderd, ea. U dient nuchter te zijn, dwz minimum 4u geen voedsel of vocht innemen.

VERDOVING: Er zijn twee manieren van verdoving die kunnen worden toegepast en die vooraf aan het onderzoek met de arts besproken worden:

1. Plaatselijke verdoving van de keel met Xylocaine spray. Een allergie aan Xylocaine moet dan zeker worden vermeld.
2. Plaatselijke keelverdoving én ook sedatie met Midazolam (inspuiting). Hiermee wordt u suf waardoor het onderzoek voor u comfortabeler kan verlopen. In dit geval wordt er afgeraden zelf een voertuig te besturen in de eerste twee uren nadien of om die dag enige risicovolle activiteiten uit te voeren. Best brengt u iemand mee om u te laten begeleiden.

Opmerking: Indien u dit specifiek wenst kan het onderzoek ook gebeuren met een lichte algemene narcose die gegeven wordt door de anesthesist. De gastroscopie gebeurt dan enkel via een daghospitalisatie en bij het maken van deze afspraak dient dit vooraf uitdrukkelijk besproken te worden. Het medicijn dat hiervoor gebruikt wordt is Propolipid, een kortwerkend middel dat intraveneus wordt opgetitreerd onder continue bewaking. Aangezien het medicament snel uitgewerkt is, bent u enkele minuten na de procedure al terug goed wakker. Toch wordt er afgeraden de dag zelf een voertuig te besturen noch andere risicovolle activiteiten uit te voeren. De enige contra-indicatie voor Propolipid is een ei- of soja-allergie, dit moet u vooraf melden. Een zeldzame complicatie die kan optreden is aspiratie van maagsappen of ademhalingsonderdrukking. Daarom is de anesthesist ook steeds aanwezig om dit snel op te vangen als dit zich zou voordoen.

VERWIKKELINGEN: Perforatie (scheur van de wand) en bloeding zijn mogelijk maar zeldzaam. Deze verwikkelingen kunnen verband houden met het onderzoek zelf of met de waargenomen afwijkingen. Deze verwikkelingen (en alle andere zeldzame complicaties) noodzaken mogelijk een verlengd ziekenhuisverblijf voor eventuele intraveneuze behandeling (bijv met antibiotica, ea) en uitzonderlijk een heelkundige behandeling.

BELANGRIJK:

- **Ziekten en allergie:** Indien u diabetes-, hart-, of longpatiënt bent, dient u dit zeker aan de arts te melden. Vermeld ook eventuele allergieën voor geneesmiddelen (bijv. antibiotica) of



latex. Vermeld ook allergie aan ei of soja indien gekozen wordt voor een algemene narcose met Propolipid.

- **Bloedverdunners:** Worden normaalgezien niet gestopt bij een gastroscopie tenzij op aanraden van de arts. Het gebruik van bloedverdunners of eventuele stollingsstoornissen dient vooraf wel te worden vermeld.

- **Nakomende resultaten:** Uw huisarts ontvangt onmiddellijk een volledig verslag van het maagonderzoek en een week later het verslag van het eventuele microscopisch onderzoek van biopsies, poliepen, ea. Dan kan u het nakomende resultaat bespreken met uw huisarts.

- Bij elk onderzoek wordt een gesteriliseerd toestel gebruikt en kan “single use”-materiaal (voor éénmalige toepassing) gebruikt worden, zoals een biopsietang, een poliepectomielus, een dilatatieballon, een werkkanaalklepje, een reinigingsborstel, ea. Geheel conform de Belgische wetgeving wordt dit aangerekend. De kostprijs van het onderzoek hangt af van het al dan niet uitvoeren van bijkomende, noodzakelijke procedures. Bij elke ambulante verstrekking wordt eveneens klein verbruiksmateriaal aangerekend. Een prijsindicatie kan opgevraagd worden via de dienst Facturatie indien gewenst (03/880.91.53).

- **Problemen:** Indien er thuis, na het onderzoek, ernstig bloedverlies zou zijn, hevige buikpijn of koorts zouden ontstaan, dient u de huisarts of behandelende arts te contacteren (03/880.91.84) of (buiten de werkuren) zich op de spoedgevallendienst aan te melden (03/880.95.20).

Heeft u nog vragen, dan kan u hiervoor terecht bij de gastro-enteroloog op het tel.nr. 03/880.91.84 of ook op de website www.hfr.be of www.maagendarmrumst.be.

Door dit dokument te ondertekenen verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze informatieverstrekking. Indien u deze toestemmingsverklaring weigert, dient u dit uitdrukkelijk te melden en kan het onderzoek niet doorgaan. Bij onmogelijkheid tot lezen of ondertekenen van dit dokument door patiënt zelf, wordt gevraagd om dit door een verwante persoon of verwijzende huisarts te laten ondertekenen en zal bij aanwezigheid van patiënt bij dit onderzoek ervan uitgegaan worden dat patiënt en familie hiermee instemmen.

Naam (voluit geschreven):

Datum: /...../.....

Handtekening: